

## Studie om Restless legs syndrome (RLS) vid Parkinsons sjukdom

Vid Centrum för Neurologi och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge pågår en studie om RLS vid Parkinsons sjukdom. Vi söker personer som har Parkinsons sjukdom och samtidig RLS som är intresserade av att delta i studien.

Studien innebär totalt 4 besök där vi ur olika aspekter undersöker bakgrunden till varför RLS uppstår och hur tillståndet eventuellt är kopplat till Parkinsons sjukdom. Studien innefattar ingen behandling men innebär en noggrann undersökning av nervfunktioner med bland annat blodprovstagning, kroppslig undersökning, ögonundersökning och neurofysiologisk undersökning. Dessa studiebesök är gratis och sker i Stockholm.

Vanliga symtom vid RLS är myrkrypningar, sockerdricks känsla, pirningar eller oros känsla i underbenen som framför allt gör sig till känna kvälls- och nattetid. Typiskt för RLS är att dessa symtom förvärras i vila när benen är stilla, t.ex. när man ligger eller sitter, för att lindras när man rör på benen såsom vid promenad. Vid RLS känner man därför ofta ett ständigt behov av att röra på benen.

Om du har ovannämnda symtom, är diagnostiserad med Parkinsons sjukdom och är intresserad av att höra mer om det aktuella forskningsprojektet är du välkommen att kontakta oss enligt nedan för mer information.

Mattias Andréasson, neurolog

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Centrum för Neurologi Stockholm  
mattias.andreasson@sll.se

Per Svenningsson, professor och neurolog

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Centrum för Neurologi Stockholm  
per.svenningsson@sll.se